



ENDODONCIA

INDICACIONES, SUGERENCIAS Y PREGUNTAS POSTRATAMIENTO

Higiene oral

Realiza una higiene rutinaria pero suave. Usa un cepillo de cerdas suaves y elimina los restos de comida de la zona afectada con suavidad.

Alimentación

Hasta que el tratamiento esté finalizado, evita masticar alimentos sólidos o duros que podrían causar que los dientes se fracturen al no tener una corona.

Si el diente está muy destruido y nos queda poco tejido sano, la reconstrucción será grande. El odontólogo te aconsejará colocar una corona para proteger el diente y evitar posibles fracturas.

Incomodidad y sensibilidad

- Es posible que experimentes incomodidad durante uno o dos días después del tratamiento, lo cual es normal. Los dientes pueden estar sensibles al masticar.
- Cuando desaparezca la anestesia, puedes sentir leves molestias. Si se te ha recetado algún analgésico, toma la primera dosis mientras persista la anestesia, de esta manera cuando la anestesia desaparezca el analgésico ya estará haciendo efecto.
- El tratamiento de endodoncia no estará completo hasta que no se coloque una corona (o funda) para proteger este diente.

¿Cuándo es necesario consultar al dentista?

- En caso de dolor intenso a pesar de la medicación;
- Si la medicación te provoca reacciones anormales.

Si tienes alguna duda o surge algún imprevisto, por favor, llámanos.